
BARRERAS PERCIBIDAS PARA EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER GÁSTRICO EN ADULTOS EN LA CIUDAD DE TALCA, ESTUDIO PILOTO

FERNANDA MIREYA FUENZALIDA ÁLVAREZ
LICENCIADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA

RESUMEN

Introducción: El cáncer gástrico se considera uno de los más frecuentes en Chile y en el mundo, a pesar de su relevancia, la principal barrera que se encuentra para reducir su elevada mortalidad es que se diagnostica tardíamente, alcanzando 754 mil muertes por año a nivel mundial. Con una relación hombre/ mujer en el mundo de 2,6:1. **Objetivo:** Se busca conocer las barreras para el diagnóstico oportuno de cáncer gástrico, también evaluar percepción de riesgo de cáncer gástrico en base a determinantes sociales y factores de riesgo. **Sujetos y Métodos:** Estudio piloto que utiliza como instrumento una encuesta de preguntas cerradas. La muestra es seleccionada por conveniencia, hombres y mujeres que residen en la ciudad de Talca en el año 2019, con plan de salud FONASA o ISAPRE, con edad entre 40 y 60 años. **Resultados:** Entre las barreras económicas para el diagnóstico oportuno de cáncer gástrico está el no tener dinero para costear un examen de cáncer gástrico (48,6%) y también para costear un tratamiento (45,7%). Como barrera de conocimiento, la mayoría de los encuestados que poseen menos de enseñanza media no percibe el riesgo de cáncer gástrico. Según tabaquismo, casi la mitad de los fumadores percibe riesgo de cáncer gástrico. **Discusión:** Según la encuesta Casen, la población de 15 años o más posee en promedio 9,9 años de escolaridad en la Región del Maule. En relación a esto la mitad de los encuestados poseen menos de enseñanza media. Estudios señalan que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer cuando el nivel de escolaridad y el nivel socioeconómico son bajos. Las barreras económicas son trascendentales para la detección precoz de cáncer gástrico, las personas con ocho años de escolaridad, solo educación básica, posee un ingreso promedio de \$328.062. Entonces, menor cantidad de años de estudio, menor ingreso mensual y menos posibilidades de atención en salud. **Conclusión:** Dentro de las barreras para la detección oportuna de cáncer gástrico, está la automedicación, insolvencia económica y el desconocimiento del GES. Además, las personas con menos años de estudio poseen menor percepción de riesgo de cáncer gástrico. Por el

contrario, aquellos que realizan acciones de riesgo como fumar y/o consumir alcohol poseen una menor percepción de riesgo de este.