
DETERMINANTES SOCIALES DE UNA PERSONA MAYOR CON CONDICIÓN PERMANENTE DE SALUD QUE INFLUYEN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

**EDGARDO GONZÁLEZ VERGARA
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE SALUD**

RESUMEN

Introducción: Actualmente, Chile cuenta con 2,6 millones de personas sobre 60 años, representando el 15,6% de la población con características heterogéneas a nivel de funcionalidad y en determinantes sociales que impactan en la capacidad de ejecutar actividades básicas de la vida diaria, es así como las personas mayores difieren en; zona de residencia, previsión de salud, ingresos, escolaridad, salud, etc., **Objetivo:** Considerando el cambio demográfico que ocurre en el país, las cifras relacionadas con dependencia o alteraciones en la funcionalidad en las personas mayores y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria en esta población, se sugiere investigar sobre los determinantes sociales de una persona mayor que presenta una condición permanente de salud que influyen en la realización de actividades básicas de la vida diaria (comer, bañarse y hacer uso del WC). **Metodología:** El estudio se realiza basado en los datos secundarios a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2017, utilizando el software Stata15 bajo el modelo logit (regresión logística binaria) donde se relaciona la variable dependiente con las variables independientes. El universo considerado en este estudio corresponde a la población sobre los 60 años de edad que presentan una condición permanente de salud y que tienen dificultades para desarrollar actividades básicas de la vida diaria, por lo tanto, se excluye a la población bajo los 60 años, registrando una muestra de 544.761 personas al incluir el factor de expansión regional (expr). La unidad de análisis corresponde a las personas de 60 años y más que tienen una condición permanente de salud y dificultades (leves, moderadas, severas o extremas) en la ejecución de actividades básicas de la vida diaria (comer, bañarse y hacer uso del WC). **Resultados:** Las personas mayores de 76 años de edad tienen un 1,34% más de probabilidad de presentar dificultades en las actividades

agrupadas como básicas de la vida diaria que aquellas que se encuentran en el rango de 60 a 75 años. Asimismo, las personas mayores que pertenecen al Quintil II tienen un 1,13% más de probabilidad que las que pertenecen al Quintil V de presentar dificultades en las actividades agrupadas como básicas de la vida diaria (comer, bañarse y utilizar el WC). Por último, las personas mayores chilenas tienen un 7,5% más de probabilidad que los extranjeros de presentar dificultades en las actividades agrupadas como básicas de la vida diaria. **Conclusiones:** La investigación coincide con la literatura nacional y extranjera sobre la asociación entre la edad avanzada (mayor de 70 años) y la condición socioeconómica como determinantes sociales que impactan la capacidad de efectuar actividades básicas de la vida diaria (comer, bañarse y utilizar el WC). Por otra parte, difiere en el impacto que produce el género, la zona de residencia y previsión de salud en las dificultades para realizar las actividades mencionadas, por lo que se requiere continuar con las investigaciones considerando dichos determinantes, así como también el estado civil y nacionalidad para determinar o descartar la asociación entre éstos y las dificultades que presentan las personas mayores con una condición permanente de salud para realizar las actividades básicas de la vida diaria.