
**RELACIÓN ENTRE IDEACIÓN SUICIDA, SÍNTOMAS DEPRESIVOS,
ANSIOSOS Y DE TRASTORNO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, FACTORES DE
VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA Y SUPRESIÓN EMOCIONAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE REDES EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES DE LA
REGIÓN DEL MAULE**

**FABIÁN IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ
JAN LUIS SEPÚLVEDA CAMPOS
PSICÓLOGO
(MENCIÓN PSICOLOGÍA CLÍNICA)**

RESUMEN

El comportamiento suicida es una problemática de relevancia mundial. Se estima que provoca aproximadamente 800 mil muertes cada año, y un número aún mayor de intentos suicidas. Usando el análisis de red, a través del ambiente Rstudio, se trabajó con una muestra de 1591 de estudiantes chilenos, residentes de Talca y sus proximidades, los cuales respondieron una batería de test que incluyó ideación suicida, síntomas depresivos, ansiosos y de estrés posttraumático, entrapamiento, derrota, rumiación negativa y supresión emocional. El objetivo del presente estudio es determinar las relaciones entre estas variables mediante el análisis de redes. Se realizaron análisis con la muestra general para determinar la organización de las variables, para posteriormente dividir la muestra entre quienes presentan altos niveles de sintomatología y entre quienes presentan bajos niveles de sintomatología, diferenciando el análisis por separado, es decir, por trastorno o clúster teórico. Los resultados arrojaron que los nodos más relevantes en las redes corresponden al síntoma de trastorno de estrés posttraumático “Sentimientos indeseados asociados al acontecimiento”, de depresión “Ánimo decaído o irritable” y percepción de Derrota y Entrampamiento. Las principales conclusiones apuntan a la diferenciación de las variables de vulnerabilidad psicológica (entrapamiento, derrota y rumiación negativa) y de síntomas psiquiátricos depresivos y de TEPT, en cuanto a la fuerza de las asociaciones entre los nodos y los perfiles sintomáticos de las personas, en base a sus niveles de centralidad dentro de las distintas redes.