



## **FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÚSO DE PRÓTESIS TOTALES REMOVIBLES EN PACIENTES PERSONAS MAYORES RECIEN REHABILITADOS**

**PATRICIO SEBASTIÁN ORTÚZAR FIGUEROA  
CIRUJANO DENTISTA**

### **RESUMEN**

**INTRODUCCIÓN:** Chile, demográficamente, se encuentra en una etapa de transición avanzada, caracterizada por una tasa de natalidad y mortalidad baja. Esto conduce a un aumento de la población mayor de 60 años. 33% de los individuos mayores de 65 años son desdentados totales. Su rehabilitación oral incluye, la confección de prótesis dentales removibles, parciales o totales. Diversos estudios han determinado un importante porcentaje de pacientes rehabilitados con prótesis removibles que no se encuentran satisfechos con sus tratamientos. **OBJETIVO:** Identificar los factores que influyen en el uso de Prótesis Totales Removibles en pacientes personas mayores recién rehabilitados inscritos en los programas de prótesis en el hospital de Talca durante los meses de julio a agosto del año 2007. **MATERIALES Y MÉTODOS:** 39 pacientes personas mayores fueron evaluadas, seleccionados por conveniencia durante los meses de junio a agosto. Una vez instaladas las prótesis nuevas se realizó la primera entrevista, que incluía: las características biodemográficas, evaluación de la calidad de los rebordes residuales (según clasificación de Atwood), experiencia previa, evaluación funcional protésica (Functional assessment of dentares) (FAD), Satisfacción protésica de los pacientes recién rehabilitados (Por medio de un cuestionario semiestructurado), protocolo de la técnica empleada para la confección de las prótesis removibles. Tres meses después se realizó una

segunda entrevista vía telefónica que incluía, la frecuencia del uso de las prótesis, la satisfacción y los usos y cuidados de ellas. **RESULTADOS:** Transcurrido tres meses de la entrega de las prótesis 84.6% de los pacientes no usa sus prótesis, y sólo 15.4% si las usa; existe una diferencia estadísticamente significativa en el uso de las prótesis totales y: la calidad del reborde óseo inferior ( $p=0.02$ ), la funcionalidad clínica de las prótesis ( $p=0.01$ ) y la satisfacción de los usuarios ( $p=0.00$ ). **CONCLUSIONES:** Los factores que influyen en el uso de prótesis removibles en pacientes personas mayores rehabilitadas durante los meses de julio agosto en el Hospital de Talca son: La calidad del reborde óseo del maxilar inferior, la funcionalidad clínica de la prótesis, y la satisfacción protésica.