

**CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN
ALUMNOS DE 5, 6, Y 7 AÑOS DEL COLEGIO TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA,
VILLA ALEGRE 2010.**

**HANS OTTO KUTZ SOTO
CIRUJANO DENTISTA**

RESUMEN

En el presente estudio se determinó el promedio de edad de erupción del primer molar permanente en los alumnos de 5 años, 6 años y 7 años 11 meses, del Colegio Timoteo Araya de la ciudad de Villa Alegre. Es un estudio descriptivo de tipo transversal en un universo compuesto por 115 sujetos de 5, 6, y 7 años, quienes cursan Pre Kínder, Kínder, 1º y 2º año básico en el Colegio Timoteo Araya, Villa Alegre. Este universo en estudio fue seleccionado mediante un muestreo sistemático, seleccionando alumno por medio en la lista del universo total, hasta completar el número de 44 niños de 5 años y 34 niños de 6 años, y 37 de 7 años, por ende, no sujeto a consideraciones del examinador, de este modo, extrapolable a la realidad de la población total. Se utilizó una ficha de erupción en la cual se utilizaron los siguientes criterios: Análisis clínico según los siguientes parámetros: 0 = El primer molar, no se encuentra visible en la cavidad oral. 1 = El primer molar presenta una cúspide visible en la cavidad oral. Con esto se determinó que el promedio del inicio de la erupción de los primeros molares Permanentes en sujetos de género masculino es de 6 años 3 meses, para los superiores, y de 6 años 1 mes, para los Inferiores. En el género femenino se determinó que la erupción es a los 6 años para los Superiores y de 5 años 8 meses para los Inferiores.

Palabras Claves: Primer Molar Permanente, Erupción.