

**ERUPCIÓN TEMPRANA DEL SEGUNDO MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS  
DE 10 Y 11 AÑOS DEL COLEGIO TIMOTEO ARAYA, VILLA ALEGRE 201**

**ROMINNA A. MORETTI ACUÑA  
CIRUJANO DENTISTA**

**RESUMEN**

El Segundo Molar Permanente es la última pieza dentaria en erupcionar, exceptuando los Terceros Molares, apareciendo en la cavidad oral a los 12 años en teoría. La práctica clínica nos indica que esta pieza erupciona en un gran porcentaje de la población antes de esta edad, lo que nos obligaría a adelantar planes de tratamientos y cambiar las políticas de salud chilena.

Se estudió una muestra de 66 sujetos de 10 y 11 años de ambos géneros, del Colegio Timoteo Araya, Villa Alegre 2010, para describir el porcentaje que presentaba una erupción temprana del Segundo Molar Permanente.

Los resultados nos indican que un gran porcentaje de sujetos de 10 y 11 años presentan una erupción temprana del Segundo Molar Permanente, encontrando valores superiores tanto para sujetos de género femenino, como para Segundos Molares Permanente Inferiores.

***Palabras claves: Segundo Molar Permanente, Erupción dentaria***