ÍNDICE

		Página
ÍNDICE DE TABLAS		**I**
ÍNDICE DE FIGURAS		**II**
ÍNDICE DE GRÁFICOS		**III**
1.	**INTRODUCCIÓN**	**1**
2.	**HIPÓTESIS**	**3**
3.	**OBJETIVOS**	**4**
	3.1 OBJETIVO GENERAL.	
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.	
4.	**REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**	**5**

5. MATERIALES Y MÉTODOS **13**

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO
5.2 MATERIAL DE ESTUDIO Y FORMACIÓN DE GRUPOS
5.3 ELABORACIÓN DE LOS CORTES **14**

5.4 OBTENCIÓN DE IMÁGENES MICROSCÓPICAS
Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN **16**

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO **18**

6. RESULTADOS **19**

7. DISCUSIÓN **23**

8. CONCLUSIONES **27**

9. RESUMEN **28**

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **29**

11. ANEXOS **32**

ÍNDICE DE TABLAS

Página

Tabla N° 1. Principales componentes de los conos de gutapercha. **7**

Tabla N° 2. Distribución de grupos de estudio. **13**

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
Fig. 1. Conos desinfectados con CHX 2% y NaClO 5,25% en tubos ependorff	**14**
Fig. 2. Criostato Leica CM 1510 S Microsystem Inc., Wetzlar, Germany)	**15**
Fig. 3. Microscopio Optika B-600TiFL (Optika, Ponteranica, Italia)	**16**

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Página

Gráfico 1. Comparación entre los grupos de conos desinfectados con CHX 2% y su control. Media de número de fisuras en función del tiempo de desinfección. Las barras de color azul indican el grupo control y las verde el grupo tratado con CHX 2%.%. **19**

Gráfico 2. Comparación entre los grupos de conos desinfectados con NaClO 5,25% y su control. Media de número de fisuras en función del tiempo de exposición. Las barras de color azul indican el grupo control y las verde el grupo tratado con NaClO 5,25% **21**

Gráfico 3. Comparación entre los grupos de conos desinfectados con CHX 2% y NaClO 5,25%. Media de número de fisuras en función del tiempo de exposición. Las barras de color azul indican el grupo tratado con CHX 2% y las verde el grupo tratado con NaClO 5,25%. **22**